

# SULFURENE

## Antiodico a base di zolfo per trattamenti in polvere

### Polvere secca

SULFURENE Registrazione del Ministero della Sanità N. 1903 del 10/04/1976



ATTENZIONE

#### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)

Bentonite e altri coformulanti q.b. a

g 35

g 100

Partita n.

Taglie: Kg.1, Kg 5, Kg 10, Kg 25

OFFICINA DI PRODUZIONE:  
PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  
90018 Termini Imerese (Palermo)

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  
Via Lungomolo n. 16 - 90018 Termini Imerese (Palermo)  
Tel. +39 0918141004

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H315** - Provoca irritazione cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA:

**PREVENZIONE: P264:** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi.

**REAZIONE: P302+P352:** In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P337+P313:** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**SMALTIMENTO: P501:** Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le normative nazionali.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Nell'applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima che la polvere si sia completamente depositata.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 5 metri per applicazioni su vite e ortaggi a frutto e 20 metri per applicazione su frutteti.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da zona non coltivata.

Pericoloso per le api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Non applicare durante il periodo di fioritura (BBCH 60-69)

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

#### CARATTERISTICHE:

SULFURENE è un fungicida di contatto, in polvere secca, specifico per il controllo di tutte le forme di Oidio, in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura, cerealicoltura, colture industriali e forestali. Esplica, inoltre, un'azione di contenimento di alcune malattie (Ticchiolatura, Ruggini) e di alcune specie di Acari, specialmente Eriofidi. Per la presenza della Bentonite, sostanza naturale fortemente igroscopica svolge una azione "fisica" contro la "muffa grigia" (*Botrytis cinerea*) dell'uva. Nei programmi di strategie antiresistenza, SULFURENE è impiegabile in alternanza con prodotti a differente meccanismo di azione.

#### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

SULFURENE si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Le dosi più alte sono da utilizzare in presenza di condizioni molto favorevoli ai patogeni e con alta pressione della malattia. E' preferibile eseguire i trattamenti nelle prime ore del mattino per favorire una migliore adesione della polvere alle colture.

**VITE** (da vino e da tavola)

Contro Oidio (*Uncinula necator*)

In pre-fioritura: 30 Kg/Ha

In post-fioritura: 25 Kg/Ha

Eeguire un primo trattamento quando i tralci misurano da 5 a 10 cm, un secondo al momento della fioritura e poi ad acini ben formati da luglio in poi, con dosi gradualmente decrescenti.

Massimo 5 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni

<b>POMACEE</b> (MELO, PERO, COTOGNO)	Contro Oidio ( <i>Sphaerotheca leucotricha</i> ) In pre-fioritura: 25 Kg/Ha In post-fioritura: 20 Kg/Ha Massimo 3 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
NESPOLO	Contro Oidio ( <i>Phyllactinia guttata</i> ) Trattamenti autunno-invernali: 20 - 25 Kg/Ha Massimo 2 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
<b>DRUPACEE</b> (Pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino)	Contro Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i> , <i>Podosphaera tridactyla</i> ) In pre-fioritura: 30 Kg/Ha Da post-fioritura a pre-raccolta: 25 Kg/Ha. In post-raccolta: 30 Kg/Ha Massimo 5 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
<b>AGRUMI</b>	Contro Oidio ( <i>Oidium tingitanum</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: 25-30 Kg/Ha. Massimo 3 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
<b>NOCCILOLO</b>	Contro Oidio ( <i>Phyllactinia suffulta</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: 20 Kg/Ha. Contro Eriofide ( <i>Phytoptus avellanae</i> ) Intervenire 2 volte ogni 7 giorni, a partire dall'emissione delle prime foglie e in concomitanza della fase di migrazione degli adulti alla dose di 25 Kg/Ha. Massimo 3 applicazioni all'anno
<b>FRAGOLA</b>	Contro Oidio ( <i>Sphaerotheca macularis sp. fragariae</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: 20 - 25 Kg/Ha. Massimo 3 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
<b>ORTAGGI</b>	
CUCURBITACEE (Cetriolo, zucchini, cocomero, melone, zucca)	Contro Oidio [ <i>Sphaerotheca (= Erysiphe) fuliginea</i> ]; <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: 20 - 25 Kg/Ha.
CARCIOFO	Contro Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: 20 - 25 Kg/Ha. Massimo 2 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
POMODORO	Contro Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: 25 - 30 Kg/Ha. Massimo 3 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
<b>FORESTALI</b> (Quercia)	Contro Oidio ( <i>Sphaerotheca leucotricha</i> , <i>Phyllactinia guttata</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: in inverno: 30 Kg/Ha. in primavera-estate: 25 Kg/Ha. Massimo 2 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni
<b>FLOREALI, ORNAMENTALI</b>	Contro Oidio ( <i>Erysiphe sp.</i> , <i>Erysiphe lagerstroemiae</i> , <i>Sphaerotheca leucotricha</i> , <i>Phyllactinia guttata</i> , <i>Sphaerotheca pannosa</i> ) Intervenire alla comparsa dei primi sintomi: 20 - 25 Kg/Ha. Massimo 2 applicazioni all'anno con un intervallo minimo di 7 giorni

#### PREPARAZIONE

La polvere può essere distribuita sulle colture con le comuni attrezzature impolveratrici.

#### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con Oli minerali e Captano.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Oli minerali e del Captano. In estate non effettuare i trattamenti durante le ore più calde e soleggiate della giornata. Su Floreali/Ornamentali, in considerazione della rapida evoluzione dell'assortimento varietale, si consiglia di eseguire saggi su piccole superfici prima di estendere il trattamento a pieno campo.

## **FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto può arrecare danno ad alcune cultivar di mele (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap), pere (Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio) e alle Cucurbitacee.

Su Vite, può arrecare danno alla cv. Sangiovese.

**Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.**

### **ATTENZIONE**

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

*Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del..... 15 luglio 2019*