

# ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO B

(Fungicida in polvere secca)

## ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO B

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. 13250 del 14/05/2009

Partita N° : vedi etichetta su sacco

### COMPOSIZIONE

100 gr. di prodotto contengono:

Zolfo puro esente da selenio g 97

Rame metallo g 0.5

(sotto forma di ossicloruro)

Coformulanti q.b. a g 100

Contenuto 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 kg



**ATTENZIONE**

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.

Via Lungomolo n. 16

90018 Termini Imerese (Palermo)

Tel. +39 0918141004

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.

Via Lungomolo 16 - 90018 Termini Imerese (PA)

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

**REAZIONE:** P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dal bordo del campo.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 97% e RAME METALLO 0,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

ZOLFO: ----

RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: Gastrolusi con soluzione latte- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.**

### CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca a base di zolfo (codice meccanismo d'azione: FRAC M 02) e rame ossicloruro (codice meccanismo d'azione: FRAC M 01).

### CAMPO D'IMPIEGO:

- Vite da tavola e da vino;

- Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino); applicazione in pre-fioritura

- Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) in pieno campo;

- Solanacee (Pomodoro, Melanzana) in pieno campo e coltura protetta.

- Cucurbitacee a buccia edule e non edule in pieno campo

### AVVERSITÀ CONTROLLATE: Oidio

### DOSI, MODALITÀ D'IMPIEGO E DI AZIONE

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Effettuare un massimo di 8 applicazioni alla dose di 25 kg/ha ad intervalli minimi di 5 giorni.

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali, ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia proseguendoli fino all'intervallo di pre-raccolta.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto: I) non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.); II) deve essere applicato ad intervallo di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano III) il prodotto è compatibile con generalità dei prodotti in polvere secca.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme

precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 06 aprile 2018 e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019"

### FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata. Evitare trattamenti a temperature superiori ai 30°C.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE. Può arrecare danno alle seguenti cultivar:

VITE: Sangiovese.

MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Wine

PERO: Buona Luigia D'Avanches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

È consigliabile effettuare saggi varietali di fitotossicità su piccole parcelle prima di applicare il prodotto.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto su pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucchini, cetriolo, cetriolino, zucca; 21 giorni su vite, pomacee e drupacee.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI, NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA, IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE OPERARE IN ASSENZA DI VENTO, DA NON VENDERSI SFUSO, IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 06 aprile 2018 e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019"**